



Verstandige keuzes bij interne geneeskunde



7) Niet standaard een protonpompremmer (PPI) voor patiënten die starten met een prednison behandeling.

Wanneer alleen glucocorticoïden (zoals prednison) worden gebruikt, is geen maagbescherming nodig. Bij een maagzweer in de anamnese of bij aanwezigheid van een andere risicofactor zoals het gebruik van NSAID's, SSRI's, salicylaten of anticoagulantia is maagbescherming met een PPI geïndiceerd.

Literatuur

1. Conn HO, Poynard T. Corticosteroids and peptic ulcer: meta-analysis of adverse events during steroid therapy. *J Intern Med* 1994;236:619-32
2. Martinek J, Hlavova K, Zavada F et al. A surviving myth – corticosteroids are still considered ulcerogenic by a majority of physicians. *Scand J Gastroenterol* 2010; 10:1156-61
3. Piper et al. Corticosteroid use and peptic ulcer disease: role of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. *Ann Intern Med* 1991; 114(9): 735-40
4. Guslandi M. Steroid Ulcers: any news? *World J Gastrointest Pharmacol Ther* 2013; 4(3): 39-40
5. Guslandi M, Tittobello A. Steroid ulcers: a myth revisited. *BMJ* 1992; 304: 655-56